

중번수 양모종

중번수 양모종 중에서 가장 비중이 큰 것은 영국이 원산지가 되는 소위 English 종이다. 그 중에서도 가장 많은 것이 다운종(Down breed)이다. 즉 South down, Shropshire, Hampshire down, Oxford down, 그리고 Dorset horn 종의 다섯 가지이고, 그 외에 Cheviot, Ryeland 등이 있다.

다운종이란 명칭은 이미 노르만 정복시대부터 사육하던 위치가 남부 잉글랜드의 평야지대이거나 혹은 구릉지대에 있었기 때문에 붙여진 이름인데, 원래는 식용으로 개량되었던 품종이 영국 각 주에서 상호 거래되면서 필요하다고 생각되는 특징을 살려서 생겨난 종자다. 따라서 이러한 다운 품종은 얼굴과 다리 부분에 브라운이나 블랙 색상을 띠고 있으며, 플리스(Fleece, 깎아 냈거나 깎아 낼 양모)는 길이가 길고 섬도가 굵은 장모종과 섬도가 극히 가늘고 치밀한 양모를 가진 세번수 양모종과의 중간에 해당하는 특징을 갖고 있다.

또한 같은 다운종 중에서도 양의 종류에 따라서 플리스의 섬도, 양모의 길이, 양모의 치밀성 등에 차이는 있지만, 모두 양모가 비교적 치밀하게 발생되어 있고 잘 건조되어 있어 양의 몸을 충분히 잘 보호하고 있다.

1. South down

1778년부터 계통적으로 개량이 진행되었던 최초의 단모종으로 다운종의 대표격이다. 현재 세계 각국에 퍼져있는 여러 가지 양 종류 중에서 가장 좋은 품질의 고기를 생산하는 한편 양모도 비교적 가늘고 고급 품질이다. 양모는 영국종 중에서는 가장 가는 것으로 24~28 μm , 길이가 35~75 mm, 한 마리당 연간 수모량은 1.6~2.5 kg 정도이다.

외양은 콧등과 네 발이 진회색을 띠고 있으며, 딱 짜여진 몸집을 하고 있다. 이것은 새끼를 많이 못 낳는 단점에다 젖이 풍부하지 못한 것이 약점이다.

2. Shropshire

South down 종과 마찬가지로 다운종 중에서는 체구가 작은 것으로, 16세기 초부터 영국의 Shropshire 지방에서 서식되었다고 한다. 현재는 영국에서보다도 외국에서 더 많이 사육하는 품종이다. 양모는 26 ~ 32 μm , 길이가 90 ~ 110 mm, 마리당 연간 수모량은 2.5 ~ 3.5 kg 정도이다. 얼굴과 네다리가 검고, 뿔이 없으며, 다른 종자와의 교배용으로 그다지 사용되지 않는다. 다만 South down 보다는 다산형이다.

3. Hampshire down

이것은 영국의 Hampshire 지방과 Wiltshire 지방에서 많이 사육되는 양종으로 19세기에 만들어 낸 양종이다. 주로 남부의 백토질 지대의 경작지에 적응된 품종이다. 양모는 26 ~ 32 μm , 길이가 50 ~ 85 mm, 마리당 연간 수모량은 1.8 ~ 2.7 kg 정도이다. 얼굴과 네다리가 암갈색을 나타내고, 털이 골고루 잘 나있다. 사료만 있으면 털 없이 잘 자라는 조숙성이다.

4. Oxford down

1830년경에 이미 Hampshire down 종과 Cotswold 종을 교배하여 만든 품종으로 양모의 길이가 길고 다운종 중에서는 가장 커다란 몸집을 하고 있다. 양모는 30 ~ 34 μm , 길이는 150 mm, 마리당 연간 수모량은 2.3 ~ 3.2 kg 정도이다. 얼굴과 네다리는 암갈색이고, Hampshire 종처럼 얼굴에는 양모가 없다. 체질이 건장하고, 비가 많고 다소 추운 지대에서 잘 자라며, 좋은 새끼를 잘 만들기 때문에 수컷은 다른 종자와의 교배용으로 자주 사용된다.

5. Dorset horn

오래 전부터 Dorset 지방에서 사육되던 확실하게 고정된 특징 있는 품종이다. 연 2회 새끼를 출산할 수 있는 특징이 있다. 양모는 28~32 μm , 길이는 75~100 mm, 마리당 연간 수모량은 2.7~3.2 kg 정도이다. 입 언저리에서 콧등에 이르는 사이에 광택이 있다. 플리스는 백색이고, 발목 부분의 짧은 양모가 크림색이다. 암수 모두 큰 뿔이 있으며, 육질이 많다.

6. Cheviot

영국종 중에서는 대단히 중요한 품종으로 스코틀랜드와 영국 국경지방의 Cheviot Hill 에서 생긴 이름으로 영국 전통적인 순종 양종의 하나다. 또한 잉글랜드나 웨일즈 지방에서도 많이 사랑을 받고 있다. 쫘긋하게 선 귀, 큰 몸집, 순백색의 양모 등은 다른 영국종과 비교가 되지 않을 만큼 독특한 모습이다. 양모는 28~32 μm , 길이는 75~125 mm, 연간 수모량은 2 kg 정도이다. 비가 많은 저지대에서는 사육이 어려워서 주로 고지대에서 많이 사육되는 산악종이다.

7. Ryeland

원래 영국 남부의 Herefordshire 지방에서 12 세기부터 사육되던 몸집이 작은 품종으로 양모의 굵기가 가느다란 것으로 유명하다. 좋은 목장에서 키우면 너무 살이 찌서 양모의 품질이 떨어지는 경우가 많기 때문에 2급 목장에서 사육된다. 플리스는 백색이고, 양모는 26~32 μm , 길이는 90~100 mm, 마리당 연간 수모량은 2.3~2.7 kg 정도이다. 숫양은 다른 품종과의 교배용으로 쓰이기도 한다. ♣ (공석붕)



<South down>



<Shropshire>



<Hampshire down>



<Oxford down>



<Dorset horn>



<Cheviot>



< Ryeland >