

/

- , / -

/

,

.

1.

1.1

(1)

2~3%

1~2% Levegal FTS(Bayer)

.

(2) /

가

5~8ml 가 38°Bé

2g/l Taspon BA(Bayer)

96~98 30~40

가 .

/

1~1.5%

80~85 30 . 가 ,

3~5%

1~2% 가

60~70 , .

1.2

가 가 .

2.

2.1

. 가

가

.
/ /

.

2.2

2~4% Levegal FTS(Bayer)

pH 4.5~5()

30~60 . 가

.

1.2 가

가 가 .

.

2.3

1g/l

2~6g/l

pH 4.5~5()

100~125

30~60

.

. 100

가 ,

가 .

2.4

1.1

Levegal FTS

.

/

가

. 가

2.2

Levegal FTS

.

.

가

. ,

가 가 .

, .

3.

3.1

.

(1)

3~5g/l

0.5%

40~60 .

(2)

3~4% 50%

3~4% (85%)

3~5%

30~40 1~2%

40~50 .

3.2

, 3.1 . ,

/ (90 , 30) .

3.3

(1)

5g/l

2~4ml/l 가 38°Bé

2~4%

120 30 .

(2)

3g/l 50%

4%

2g/l

pH 3()

120 20 .

3.4

.

.

.

.

(가) (100~125)

/ .

, 가

가 . ,

가 .